

Gradering av klauvforandringer relatert til fotråte

Forandringer i klauvene på grunn av fotråte graderes fra 0 (normal) til 5.



Normale klauver (lam om høsten etter fjellbeite): Symmetriske klauver, jevn såleflate, frisk hud i klauvspalten, jevn hvit linje, glatt overgang såle – indre klauvvegg.



Lett rødme i huden i klauvspalten. Ses ofte når dyra har gått på fuktig beite, men kan også skyldes en begynnende infeksjon med *D.nodosus*.



Grad 1: Mild betennelse i huden i klauvspalten: "irritasjon", mild rødme og fuktighet. Klauvspalteeksem eller tidlig /mildt stadium av fotråte.



Grad 2: Tydeligere betennelse i klauvspalten, evt. begynnende nedsmelting (oppløsning av vev) i overgangen mellom hud og horn. Ingen underminering av horn i sålen.



Grad 2 med begynnende nedsmelting i overgangen hud- horn, men ingen underminering av sålen.



Grad 3: Underminering (begynnende løsning) av sålen. Undermineringen begynner fra klauvspalten, får ofte en halvmåneform.



Grad 4: Underminering (løsning) av sålen helt ut til det harde hornet i klauvens yttervegg.



Grad 5: Underminering av hornet som også angår klauvkapselens yttervegg



Kroniske forandringer: Etter en alvorlig, akutt fotrâte-infeksjon kan det bli varige forstyrrelser i klauvveksten med unormal klauvform. Disse kan bli være kroniske smittebærere selv om de ikke viser akutte symptomer eller halthet.

Slike forandringer kan være vanskelig å skille fra klauvforandringer av andre årsaker, og må vurderes sammen med det generelle sjukdomsbildet i besetningen.

Foto: Animalia – Helsetjenesten for sau, Svenska Djurhälsovården og Embrik Gjengedal